



# 維尚泌尿科診所

## 手術說明暨同意書

病人姓名：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 病歷號碼：\_\_\_\_\_

### 一、擬實施之手術（如醫學名詞不清楚，請加上簡要解釋）

1. 診斷：節育計畫
2. 建議手術名稱：輸精管結紮手術
3. 手術建議原因：避孕
4. 手術步驟、效益、風險、替代方案、術後注意事項等醫師說明請詳閱背面的書面說明。

### 二、醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項手術之相關資訊，特別是下列事項：
  - 需實施手術之原因、手術步驟與範圍、手術之風險及成功率。
  - 手術併發症及可能處理方式。
  - 不實施手術可能之後果及其他可替代之治療方式。
  - 預期手術後，可能出現之暫時或永久症狀。
  - 如另有手術相關說明資料，我並已交付病人。
2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次手術的問題，並給予答覆：

- (1) 結紮手術後請務必返診執行精液檢查，確認精液中無精蟲後才可停止避孕。
- (2) 術後若有極少見的輸精管癭管生成，造成精液中精蟲殘留則需再次手術

手術負責醫師：\_\_\_\_\_（簽名） 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

### 三、病人之聲明

1. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個手術的必要性、步驟、風險、成功率之相關資訊。
2. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他治療方式之風險。
3. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解手術可能預後情況和不進行手術的風險。
4. 針對我的情況、手術之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
5. 我瞭解在手術過程中，如果因治療之必要而切除器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告，並且在之後會謹慎依法處理。
6. 我瞭解這個手術可能是目前最適當的選擇，但是這個手術無法保證一定能改善病情。

基於上述聲明，我同意進行此項手術，並已完整閱讀同意書及說明書。

立同意書人簽名：\_\_\_\_\_

關係：病人之\_\_\_\_\_

(\*若您拿到的是沒有醫師聲明之空白同意書，請勿先在上面簽名同意)

(立同意書人身分請參閱附註二)

身分證統一編號 / 居留證或護照號碼：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

時間：\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

配偶：\_\_\_\_\_ 身分證統一編號 / 居留證或護照號碼：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

時間：\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分



附註：

## 一、一般手術的風險

局部麻醉手術，術中可能產生血壓上升、心肺不適或過敏反應，主治醫師會視情況給予藥物治療或停止手術進行。

## 二、同意書需本人及配偶親自簽名。

三、醫療機構應於病人簽具手術同意書後三個月內，施行手術，逾期應重新簽具同意書，簽具手術同意書後病情發生變化者，亦同。

四、手術進行時，如發現建議手術項目或範圍有所變更，當病人之意識於清醒狀態下，仍應予告知，並獲得同意，如病人意識不清醒或無法表達其意思者，則應由病人之法定或指定代理人、配偶、親屬或關係人代為同意。無前揭人員在場時，手術醫師為謀求病人之最大利益，得依其專業判斷為病人決定之，惟不得違反病人明示或可得推知之意思。

五、醫療機構為病人施行手術後，如有再度為病人施行手術之必要者，仍應重新簽具同意書。

六、醫療機構查核同意書簽具完整後，一份由醫療機構連同病歷保存，一份交由病人收執。

## 輸精管結紮手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術的效益、風險及替代方案的書面說明，請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，您也可以有第二種選擇的機會，讓我們一起為了您的健康努力。

### 手術說明及步驟：

病人平躺於手術檯，先刮除陰部毛髮後，塗上消毒藥水，醫師從陰囊皮膚注射局部麻醉藥，在陰囊皮膚打開0.5~1公分的傷口，用特製器械抓出輸精管，切斷後用可吸收縫線結紮，並將斷端燒灼閉鎖。

### 手術預測效益：

達到節育的目的，輸精管結紮手術是安全有效的避孕方法。成功率可高達99%以上。

### 手術可能風險及併發症：

根據國際英國泌尿科醫學期刊「1999, feb, 83 (3) : 283-4」對4053位接受輸精管結紮手術者的研究調查顯示手術併發症相當低。

併發症	發生率	處理方式
血腫塊	萬分之4.7 (2位)	藥物治療或硬塊清除術
術後硬塊	萬分之7 (3位)	藥物治療或血塊清除術
傷口感染	萬分之7 (3位)	藥物治療或清瘡術
輸精管瘻管	萬分之4.7 (2位)	瘻管切除

### 可能替代方案：

您也可以採用戴保險套、裝子宮避孕器、輸卵管結紮、或服用避孕藥的方式等等。

### 醫師補充說明：

1. 手術如有傷口腫脹疼痛問題請至門診由醫師評估處置。
2. 手術 2 個月內行房仍需避孕，因可能有殘餘精子存在。術後2-3個月或排空15次以上，務必再回診檢驗精液。
3. 於門診時段內攜帶健保卡及當天留存的檢體(1-2小時內)回診檢驗即可。